

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
 ET DE LA FORÊT

 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

 Bulletin Technique N° 191
 du 11 Mars 1991

=====

:
:
: VIGNE : Desherbage, Eutypiose .
:
: ARBORICULTURE FRUITIERE : Cloque, Acariens
:
: CULTURE MARAICHERE : Tomate,
: Botrytis
:=====

VIGNE

** Eutypiose

Cette nouvelle maladie est à surveiller durant les opérations de taille . Brûler les souches mortes ou les bras (cornes), sur lesquels se développent les spores de la maladie, mais ne fructifient pas sur les sarments.

** Desherbage de prélevée

Rappel de l'utilisation des desherbants sur vigne .

a)- De plus de quatre ans

Association de Triazine + Diuron en fractionnement pour minimiser les risques de phytotoxicité.

Les doses sont les suivantes

PRODUITS	APPORT UNIQUE	APPORT FRACTIONNE (1)	
		PREMIERE APPLICATION	DEUXIEME APPLICATION
VEGEPRON DS	12 l	6 l	8 l
PERAL VIGNE (2)	6 l		
CLERY	6 l	3 l	4 l
TREVI 10	10 l	6 l	6 l
PENICAN	7 l	4 l	4 l
CLAIRSOL 85	18 l	9 l	12 l
ARROW 3000	10 l	6 l	6 l
BARAL (3)	8 l	6 l	4 l

77

utilisés :

b) - De moins de quatre ans : Dès la plantation , peuvent être

- Amex - 10 l/ha, Cent 7 8l/ha
- Avrinol FL - 9 l/ha - Surflan 8 l/ha

Remarques : Amex 820 et Devrinol FL 9 l/ha : résultats irréguliers

- Le Cent 7 - bon sur dicotylédones mais insuffisant sur graminées.
- Surflan - bon sur graminées et amarantes, chenopodes lactifères, nul sur érigerons, morelles, renouées.
- Cent 7 6 l/ha + Surflan 6 l/ha satisfaisants.

CULTURES FRUITIERES

**** Cloque**

Renouveler le traitement au Captane, Ferbame, Thirame, Zirame, en fonction des pluies jusqu'à l'étalement des premières feuilles.

**** Monilia, botrytis**

Renouveler au stade G.H surtout pour les amandiers.

**** Acarie**

Evaluer le niveau de population des oeufs d'hiver avant d'intervenir.

Observer à la loupe une centaine de bourgeons présents sur bois de 2 ans, sur 25 arbres pris au hasard du verger.

Déterminer le nombre d'oeufs pour quantifier si la population est faible, moyenne ou importante et nécessite ou pas d'intervention.

Contactez le S.R.P.V. pour plus de précisions .

CULTURES MARAICHIERES

**** Tomate**

Rappel de nettoyage des serres et tunnels.

En fin de culture, éliminer rapidement des serres les déchets de culture, brûler ou les recouvrir avec du plastique , ou les traiter avec de la chaux vive ou du sulfate d'ammoniaque.

Désherber l'intérieur des serres, autour des chauffages, des doseurs de fertilisation ; désinfecter les structures à l'eau de javel à 5 % et 48 chlorométrique, ou autre désinfectant Hortiseptyl, Hortima...

.../...

Tomate (suite)

Si on avait observé des aleurodes " mouches blanches" à la dernière campagne, traiter la serre vide au Dichlorvos.

Désinfecter tout matériel à l'eau de javel.

Lorsque les tomates sont en place, ne pas oublier de suspendre les **panneaux jaunes** pour détecter les premiers **aleurodes** afin de démarrer la **lutte biologique**.

A ce propos , assurez vous que les commandes de **prédateurs** aient bien été réceptionnées auprès des Etablissements fournisseurs spécialisés.

Des renseignements plus précis sur la lutte biologique seront indiqués dans le prochain bulletin.

Pour les tomates déjà **poussantes**, attention aux attaques de **botrytis** sur tiges, se méfier des fortes hygrométries dans les tunnels. Il faut donc aérer tôt le matin.

Lors des traitements, alterner les produits ; ne pas oublier que dans la majorité des cas ils n'ont pas d'action curative mais préventive sur les **futures contaminations**.

Tableau des produits utilisables sur botrytis de la tomate

SPECIALITES COMMERCIALES	MATIERE ACTIVE	DOSE P.C. HA
EUPARENE	dichlofluanide	2 500 g
ROVRAL	iprodione	1 500 g
SUMISCLEX	procymidone	1 500 g
RONILAN	venchlozoline	1 500 g
N.B.S existe aussi en poudrage	thirame	Vérifier les doses
N.B.S.	folpel	"